

威力旺[®] Cantus[®]

保護及初期治療藥劑

(白粉列) 50% 水分散性粒劑

產品特性

1. 適用範圍廣泛。
2. 傳統的系統移行性。
3. 耐雨性佳。
4. 具極佳保護作用及初期治療效果。
5. 適合病害綜合防治使用。



產品規格：
100公克 鋁箔袋
250公克 鋁箔袋

對病原菌的作用機制

- 威力旺屬於苯甲醯胺類(Anilide)之新型殺菌劑，具極佳保護作用及初期治療效果。此類藥劑之作用機制乃是透過阻斷病原菌之呼吸作用，有效抑制孢子發芽、發芽管生長及吸附器之形成，對少部分病原真菌，具有抑制菌絲生長及孢子形成的效用。
- 威力旺主要作用點為抑制粒線體內膜上電子傳遞鏈中的複合物II琥珀去氫酶的作用，導致能量的產生受阻，氨基酸及脂質的合成被阻斷，進而瓦解病菌的生長。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
瓜果類 瓜菜類 胡瓜	白粉病	0.5公斤	2500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	小黃瓜採收前6天停止施藥。 胡瓜、瓜果類及其他瓜菜類採收前12天停止施藥。
豆科乾豆類	灰黴病	0.3-0.5公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前21天停止施藥。
紅豆	白粉病	0.2-0.3公斤	2500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前21天停止施藥。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
亞麻	灰黴病	0.7-1.1公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	適用於亞麻籽。 採收前21天停止施藥。
胡麻	白粉病	0.2-0.5公斤	2500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前21天停止施藥。
結球萵苣	灰黴病	0.2-0.7公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前21天停止施藥。
不結球萵苣 與半結球萵苣	灰黴病	0.2-0.7公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前14天停止施藥。
枸杞	灰黴病	0.3-1公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	適用於枸杞葉。 採收前14天停止施藥。
蔥	灰黴病	0.5-1.3公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前14天停止施藥。
豆薯	白粉病	0.2-0.3公斤	2500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
	灰黴病	0.3-0.5公斤	1500		
狗尾草	灰黴病	0.3-0.5公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
闊葉大豆	灰黴病	0.3-0.5公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
馬鈴薯	灰黴病	0.3-1公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前14天停止施藥。
蔥科根菜類	灰黴病	0.5-1.3公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前14天停止施藥。
茄科果菜類	白粉病	0.2-0.6公斤	2500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
	灰黴病	0.3-1公斤	1500		
洛神葵	灰黴病	0.4-0.8公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
秋葵	灰黴病	0.4-0.8公斤	1500	病害發生初期開始施藥。 必要時隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
豆菜類	白粉病	0.4公斤	2500	病害發生初期開始施藥。必要 時隔7天施藥1次，最多3次。	採收前9天停止施藥。
	白粉病	0.2-0.3公斤	2500		
	灰黴病	0.3-0.5公斤	1500		
豌豆	白粉病	0.4公斤	2500	病害發生初期開始施藥。必要 時隔7天施藥1次，最多3次。	採收前9天停止施藥。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
香蕉	黑星病	0.25公斤		必要時隔14天施藥1次，最多3次。	加水至25公升/公頃，以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片。採收前6天停止施藥。
草莓	白粉病	0.75公斤	1500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次，最多4次。	採收前5天停止施藥。
	灰黴病				
鼠李科梨果類	白粉病		2500	病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次，最多4次。	採收前21天停止施藥。
花木	白粉病	0.2-1公斤	2500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。
玫瑰	白粉病	0.4公斤	2500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次，最多3次。	
蓖麻	灰黴病	0.5-1.1公斤	1500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。	
黃麻	灰黴病	0.5-0.8公斤	1500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。	
鐘麻	灰黴病	0.7-0.8公斤	1500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。	
亞麻	灰黴病	0.7-1.1公斤	1500	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。	