

草霸王[®] Basagran[®]

選擇性萌後除草劑

(本達隆) 44.1% 溶液

產品特性

1. 對闊葉雜草如野苳菰、鴨舌草、螢蘭、瓜皮草、木靈草，莎草科等有效。
2. 屬於選擇性殺草劑。



商品規格：
500毫升 膠瓶
1000毫升 膠瓶

對雜草的作用機制

草霸王屬於Thiadiazine系化合物，為接觸型萌後處理劑、藥劑可經由葉部吸收，亦可由根部吸收後經木質部由下往上迅速移行。其作用機制為干擾光合作用中的電子傳遞鏈，使二氧化碳之同化作用無法進行，導致雜草生長遲滯而死亡。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
水稻	雜草	3公升	200	播種後	防除濕田直播雜草，播種前2天蓋平田面濁水狀時施用10%殺丹粒劑或5%丁基拉草粒劑20公斤保持3-5公分積水，播種時排水，播後30天前排乾積水施藥。
水稻	雜草	3公升	200	插秧前	防除秧田雜草，秧田移植前第1期作11天第2作5天時施藥並保持排水狀3-5天；如稈草多時於秧苗1葉時排乾積水施用35%除草靈乳劑，2公升/公頃，施藥後排水3-5天。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
水稻	雜草	3公升	200	播種後	防除中間作直播田雜草，播種後7-10天保持3公分水深先用10%殺丹粒劑或5%丁基拉草粒劑20公斤再於播種後30天排水施本劑，積水3-5天。稈草少時於30天前排乾施藥。
水稻	雜草	3公升	200	生長中期時 施用	1.防除移植本田雜草。第1期作插秧後30-40天，2期作20-30天施藥。施藥前1天排乾積水後噴於草上，2-5天後灌水。生長初期先用一般殺草劑以達安全殺草效果。
水稻	雜草	1.5-2.0公升	稀釋水量 30公升	插秧後	1.防除移植本田雜草。中期處理：1期作插秧後20-40天；2期作20-30天施藥，於前1天排乾積水時施於草上；須用特製控制粒子噴霧器(CDA法)。無風或微風時噴施，人行方向與風向成直角，距離水稻9-10公分高，左右搖動約五公尺；應選用每秒流量2公撮之噴嘴，每分鐘走約16-18公尺之步速每分地(0.1公頃)約需26-28分鐘。
水稻	雜草	3公升	加水稀釋至 20公升		1.適用於無人飛行載具，藥滴體積中值粒徑(VMD, Volume Media Diameter)應大於145微米。2.插秧後20~40日，田面雜草長至10公分時施藥。3.施藥前1日排乾積水後均勻噴施於雜草植株上，施藥後2~5天始可灌水。 1.防治水稻移植本田雜草。2.風速大於每秒3公尺時，請勿噴施。3.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。4.操作者應站上風處，並保持適當操作距離。5.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢局農藥資訊服務相關網站。

